

T/SAASS

团 体 标 准

T/SAASS 214—2025

中兽药在蛋鸡中的应用技术规范

Technical specification for the application of traditional chinese medicine in laying hens

2025 - 07 - 30 发布

2025 - 07 - 30 实施

山东农学会 发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由山东省农业科学院家禽研究所提出。

本文件由山东农学会归口。

本文件起草单位：山东省农业科学院家禽研究所、山东蓝海生态农业有限公司、山东中谷饲料有限公司。

本文件主要起草人：殷斌、李桂明、林树乾、赵增成、闫遵祥、孟凯、袁小远、董雯雯、王文彬、尹振晨、李福伟、刘玮、王云超、刘庆彬、朱应波、于洋、周永恒、刘丹。

中兽药在蛋鸡中的应用技术规范

1 范围

本文件规定了中兽药在蛋鸡养殖中应用的辨证治则、质量要求、使用原则、使用方法、使用记录、配伍规则和档案保存。

本文件适用于中兽药在蛋鸡养殖场中的使用和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 3445 畜禽养殖场档案规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

中兽药 traditional chinese veterinary medicine

中兽药是将中医药理论应用于动物身上，用于动物疾病进行预防和治疗时的药品。

3.2

育雏育成期 brooding and growing period

从雏鸡出壳到性成熟前的阶段，通常为0周龄~18周龄。

3.3

产蛋前期 pre-lay period

蛋鸡开产到产蛋达到50%，通常为19周龄~22周龄。

3.4

产蛋高峰期 peak production period

蛋鸡产蛋率达到80%以上并维持较高水平的阶段，通常为23周龄~66周龄。

3.5

产蛋后期 late-lay period

蛋鸡产蛋率逐渐下降的阶段，通常为66周龄以后。

4 蛋鸡各生长阶段的辨证治则

4.1 育雏育成期

采用益气健脾、健胃消食、清热燥湿的中兽药，达到蛋鸡促生长、促发育、抗应激、提高免疫的效果，使蛋鸡体型标准、发育完全、发病率低。

4.2 产蛋前期

采用益气健脾、清热燥湿、滋补肝肾的中兽药，达到蛋鸡提高免疫、促进肝脏代谢、肠道健康的效果，使蛋鸡适时开产、发病率低、饲料转化率高。

4.3 产蛋高峰期

采用益气健脾、活血补血、补肾壮骨、疏肝利胆的中兽药，达到蛋鸡高产、稳产、提高蛋品质、提高免疫的效果，使蛋鸡的蛋品质好、发病率低、高产期延长。

4.4 产蛋后期

采用调理气血、补肾壮骨、清热解毒的中兽用，达到调节肝脏代谢、缓解骨质疏松、改善蛋品质的效果，使蛋鸡延缓产蛋下降、延长产蛋周期，改善蛋品质和提高饲料转化率。

5 中兽药产品的基本质量要求

5.1 中兽药应是农业农村部批准的 GMP 生产企业生产的合格产品。

5.2 使用者购买中兽药时，应使用国家兽药综合查询 APP 扫描产品二维码或在国家兽药信息查询系统中或核对相应产品基本信息，包括生产企业、批准文号、标签、生产日期、有效期等。

5.3 中兽药外观包装应无破损、无涨袋（瓶）、结块等现象，性状符合要求。

6 中兽药的使用原则

6.1 坚持“治未病”，以“预防为主，防治结合”为原则，根据蛋鸡各生长阶段的特点进行辨证施治，合理选择、使用中兽药。

6.2 应在执业兽医师或相关专业人员的指导下使用中兽药。

6.3 使用者需按照中兽药标签和说明书要求用药，包括给药途径、剂量、疗程、适应症等。

6.4 对于发病急、传播速度快、死亡率较高的疾病，优先选择口服液或合剂、可溶性粉、可溶性颗粒剂型，采用饮水给药；对于发病缓慢、传播速度慢、死亡率低、采食量无明显减少的疾病，宜选择散剂，采用饲料添加给药。

7 使用方法

7.1 口服液或合剂

用前应摇匀，按照使用说明书的配比兑水饮用，建议2 h内饮完。

7.2 可溶性粉或可溶性颗粒

应先加适量清洁水充分溶解，再加入饮水桶内，混匀后饮用，建议2 h内饮完。

7.3 散剂

散剂应与粉料混合均匀后使用，不宜与颗粒料混合使用。

8 中兽药配伍与禁忌

8.1 中兽药+中兽药

当蛋鸡发生混合感染性疾病或同时出现两种或以上典型症状的疾病时，应选择主治、功效相符的两种或两种以上的药物配伍使用。

8.2 中兽药+化学药物

当蛋鸡发生死亡率较高或病原体明确的疾病时，选择对病原体敏感的或对症化学药物与中兽药配伍使用。

8.3 配伍禁忌

有配伍禁忌的药物（参考“十八反、十九畏”）不能混合使用，以免有效成分析出、沉底，影响药效或产生毒副作用。

9 中兽药疗程

9.1 清热解毒药、利尿通淋药

一般连续用药3 d~5 d为一疗程，如用药有效但仍未治愈的疾病，可再用一个疗程，病情稳定即停止使用。清热解毒药用药时间超过两个疗程，会损伤蛋鸡脾胃功能和正气。

9.2 补中益气药、健脾消食药

连续用药5 d~7 d为一疗程，为巩固疗效，可连续使用2个~3个疗程。

9.3 常用中兽药代表药物

预防性蛋鸡中兽药的选用，参见附录A；治疗性蛋鸡中兽药的选用，参见附录B。

10 使用记录与档案保存

养殖场中兽药使用过程中，应对中兽药产品信息、用药信息等进行详细记录，见附录C。档案管理按照NY/T 3445的规定执行，档案至少保存3年。

附 录 A
(资料性)
预防性中兽药选用

预防性中兽药的选用见表A.1。

表A.1 预防性中兽药的选用表

用途	代表药物	注意事项
提高疫苗免疫效果	地黄散、人参茎叶总皂苷颗粒、香菇多糖、香菇多糖粉、芪芍增免散	按产品说明书要求使用，不要与疫苗混合后使用
提高免疫力	紫锥菊末（口服液）、芪藿散、芪贞增免颗粒、黄芪多糖可溶性粉（口服液、注射液）、玉屏风散（口服液）	按产品说明书要求使用
促进生长	博落回提取物（博落回散）、五味健脾合剂、山花黄芩提取物散	按产品说明书要求使用
促进产蛋	蛋鸡宝、益母增蛋散、加味激蛋散	1、不适于温热病引起的产蛋下降 2、适当延长光照时间、提高营养水平
防暑热	解暑抗热散、清暑散、香薷散、消暑安神散	1、注意夏季禽舍的降温与通风 2、供应充足、清洁的饮水
防球虫病	常青球虫散、驱球止痢合剂（散）、铁凤抗球散	注意家禽与粪便的隔离和环境卫生

附 录 B
(资料性)
治疗性中兽医的选用

治疗性中兽医的选用见表B.1。

表B.1 治疗性中兽医的选用表

证型		临床症状	剖检特征	代表药物	注意事项
温热证	轻证	精神沉郁，拉稀，采食量下降、饮水量增加、产蛋下降	无明显病理变化	双黄连口服液	1、保持舍内空气清新、足够、新鲜的饮水 2、补充多维素和电解质
				板青败毒口服液	
	重证	精神极差，采食量急剧下降，饮水量猛增，排水样绿色或黄白色稀便；身热，气喘；冠髯发绀、神昏、痉挛、抽搐，甚至突然死亡等	皮下、肌肉出血；胸腺肿大、出血；肺脏水肿、淤血、出血，呈紫黑色等	清营口服液	1、保持舍内空气清新，足够、新鲜的饮水 2、补充多维素和电解质 3、注意配合健脾类中药调理脾胃功能，恢复采食量
				清瘟解毒口服液	
				黄连解毒微粉	
				黄栀口服液	
				麻杏石甘口服液	
三黄金花散					
金叶清瘟散					
茵陈解毒颗粒					
感冒	风寒感冒	恶寒（远离通风口）、饮水量减少，流鼻涕、眼泪，采食量减少，拉稀等	气囊轻度浑浊，气管轻度出血，气管内有少量粘液，其它器官无明显病变	荆防败毒散	1、注意保持舍内温度适宜 2、保持空气清新
	风热感冒	恶热（远离热源）、饮水量增加、采食量减少、叫声嘶哑等	喉头或气管上段出血，气管内有黏液	银翘散 穿板鱼连散 板青颗粒 霍香正气口服液 茵陈金花散	1、保持舍内凉爽、空气清新 2、饮水清凉、充足
哮喘	轻证	精神差，采食量降低；甩头，流鼻涕，咳嗽、气喘，有明显痰鸣（呼噜）声；	气囊浑浊、增厚，或有灰白色或淡黄色渗出物；气管出血、气管内有黏液、肺脏水肿等	葶苈子散 麻黄鱼腥草散 穿鱼金荞麦散 加减清肺散	1、保持舍内空气清新 2、必要时可配合对症化药
	重证	采食量严重下降，鸡舍内有明显尖叫声，头部肿胀，冠髯发绀，急性死亡等	喉头出血；气管严重出血，呈鲜红色，气管内有黏稠分泌物或血样渗出物；支气管内有淡黄色干酪样渗出物堵塞；肺脏淤血等	桑仁清肺口服液 百部射干散 喉炎净散	1、保持舍内空气清新 2、配合清瘟解毒口服液或化痰化药治疗
淋证、痛风		精神沉郁，采食量减少或废绝，饮水量增加，鸡冠萎缩，趾爪干枯，排大量灰白色或白色、腥臭稀便；趾跖关节肿大，行走困难，蹲伏等	肾脏肿大，呈灰黄色或灰白色，内有大量灰白色尿酸盐沉积；输尿管增粗，内有灰白色尿酸盐沉积；甚者腹膜、心包膜、气囊及内脏器官表面、关节腔内均有大量灰白色尿酸盐沉积	金钱草散 木通海金沙散 防己散	1、降低饲料蛋白含量 2、停用抗生素 3、控制用药时间，以通为度 4、供应充足饮水，补充维生素、电解质
腹水		消瘦，腹部严重下垂，呈犬坐	腹部有大量淡黄色渗出液，肝脏硬化，肾脏肿大等	二苓石通散 八正散	1、保持舍内通风良好 2、降低饲料蛋白质含量 3、停用肝肾毒性药物
泄泻		消瘦、冠髯苍白、采食量降低、排稀便或料便，无明显臭味	腺胃肿大、乳头模糊，肌胃角质层溃疡，肠道无明显病变	理中散 健鸡散 化湿止泻散	慎用清热类中药

证型		临床症状	剖检特征	代表药物	注意事项
湿热下痢	轻证	精神沉郁，采食量降低，排腥臭稀便或溏便	剖开腹腔恶臭；肠粘膜水肿或出血；腹膜炎、心包炎、肝周炎等	白头翁汤 穿白地锦草散 白榆散 连参止痢颗粒 四黄止痢颗粒	1、保持舍内良好通风 2、及时清除舍内粪便
	重证	身热，采食量降低，饮水量增加，冠髯苍白，粪便带血，尾羽粘黏带血粪便	肠粘膜出血，肠管内有血样粪便或血液	白头翁汤	1、配合维生素 K3 等止血药治疗 2、适当配伍敏感抗生素 3、及时清除禽舍内及运动场内的粪便
肝肾肿大		精神沉郁，采食量降低，饮水增加，粪便白头增多或排灰白色稀粪	肝脏肿大或有出血斑；肾脏肿大，呈灰黄色；输尿管内有尿酸盐沉积	商陆口服液 消肿解毒散	1、停用化学药 2、供应充足清洁饮水、电解质
脂肪肝		体重超标，腹部下垂，产蛋率降低，甚者突然死亡	腹部、肠系膜沉积大量脂肪，肝脏呈土黄色，肿大，易碎；急性死亡鸡肝脏破裂，腹腔有大量凝血块	护肝颗粒 茵栀黄口服液 清瘟解毒口服液 黄栀口服液	1、降低饲料能量水平 2、饲料中添加适量的氯化胆碱

附 录 C
(资料性)
中兽药使用记录

中兽药使用记录见表C.1。

表C.1 中兽药使用记录表

使用日期	兽药通用名称	产品批准文号	产品批号	群体用药			个体用药		使用方法	使用总量 (mL或g)	停药时间
				圈号	数量	日龄	日龄	编号			