

T/NAASS

宁夏回族自治区农学会团体标准

T/NAASS 173—2026

双羔滩羊品系鉴定及等级评定技术规程

Code of practice for Two or even more Lamb Identification of Tan Sheep

2026-01-15 发布

2026-01-25 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区畜牧工作站提出。

本文件由宁夏回族自治区农学会归口。

本文件起草单位：宁夏回族自治区畜牧工作站、西北农林科技大学、红寺堡区天源良种羊繁育养殖有限公司、宁夏农林科学院动物科学研究所。

本文件主要起草人：陈亮、刘统高、杨冲、王倩、周世卫、王小龙、寇启芳、冶文兴、虎雪姣、李晓娜、吴爽、李珂、任宇佳、田黛君、张坤、王锦、赵正伟、马丽娜、田进阳、唐心月、刘宁、刘博

双羔滩羊品系鉴定及等级评定技术规程

1 范围

本标准规定了双羔滩羊品系鉴定的定义和术语、生产性能、等级评定、种用要求和档案记录的技术要点。

本标准适用于宁夏双羔滩羊品系鉴定和等级评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2033 滩羊

GB/T 27534.4 畜禽遗传资源调查技术规范 第4部分：绵羊

NY/T 1236 绵羊、山羊生产性能测定技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 双羔滩羊 two or even more lamb of Tan sheep

一胎能够生产双羔的滩羊。

4 生产性能

4.1 繁殖性能

公羊6月龄~7月龄、母羊7月龄~8月龄性成熟。公母羊初次配种年龄为1.5岁，妊娠期149 d~156 d，产羔率为154 %~169 %。

5 等级评定

5.1 评定方法

按照GB/T 2033、GB/T 27534.4、NY/T 1236执行。

5.2 评定次数

根据生长发育阶段分3次评定，初生评定时间为羔羊出生后3 h内，二毛羔羊评定时间为35 d龄，育成羊评定时间为18月龄。

5.3 评定内容

5.3.1 初生羔羊

评定内容包括毛股自然长度、毛股弯曲数、花案、体格发育、初生重等。

5.3.2 二毛羔羊

评定内容包括花穗类型、毛股弯曲数、花案、体格发育、体重、弯曲占毛股的比例、毛股紧实度、毛色特征、有无外貌缺陷等。

5.3.3 育成羊

评定内容包括体格、体质、体重、毛色特征、毛股长度、有无外貌缺陷等。

5.4 评定等级

5.4.1 初生羔羊

按表1的要求进行等级评定。

表1 初生羔羊等级评定

等级	毛长/cm	弯曲数	花案	体格发育	公羔体重/kg	母羔体重/kg
1级	>5.0	≥6	清晰	良好	≥3.2	≥3.0
2级	>4.5	≥5	较清晰	正常	≥3.2	≥3.0
3级	<4.5	<5	欠清晰	稍差	<3.2	<3.0

5.4.2 二毛羔羊

按表2的要求进行等级评定。

表2 二毛羔羊等级评定

等级	弯曲数	花案	体格发育	体重/kg		弯曲/毛股	弯曲弧度	光泽	毛股紧实度	毡毛	色斑	
				公羔	母羔							
串字花	特级	≥7	清晰	良好	≥9.0	≥8.0	2/3~3/4	均匀	好	紧	无	无
	1级	≥6	清晰	正常	≥8.0	≥7.0	2/3~3/4	均匀	好	紧	无	无
	2级	≥5	一般	一般	≥7.0	≥6.0	1/2~2/3	一般	一般	紧	-	-
	3级	<5	欠清晰	稍差	<7.0	<6.0	1/2~2/3	欠均匀	差	松	有	有
软大花	特级	≥7	清晰	良好	≥10.0	≥9.0	>2/3	均匀	好	紧	无	无
	1级	≥6	清晰	正常	≥9.0	≥8.0	>2/3	均匀	好	紧	无	无
	2级	≥5	一般	一般	≥8.0	≥7.0	1/2~2/3	一般	一般	紧	-	-
	3级	<5	欠清晰	稍差	<8.0	<7.0	<1/2	欠均匀	差	松	有	有

5.4.3 育成羊（18月龄）

按表3的要求进行等级评定。

表3 育成羊等级评定

等级	外貌特征	体格	体质	发育	羊毛					体重/kg		二毛等级
					形状	长度/cm	分布	密度	色斑	公羊	母羊	
特级	明显	大	结实	好	股状	≥15.0	一致	特级	明显	≥58.0	≥49.0	好
1级	明显	较大	结实	良好	辫状	≥15.0	一致	1级	明显	≥49.0	≥41.0	良好
2级	一般	中	细致	一般	绉状	≥12.0	一般	2级	一般	≥41.0	≥32.0	一般
3级	缺陷	下	粗糙	差	散状	<12.0	差	3级	缺陷	<41.0	<32.0	差

6 种用要求

育成公羊一级及以上、母羊二级及以上。

7 档案记录

档案记录保存3年以上。评定等级记录见附录A。

附 录 A
(资料性)
双羔滩羊等级评定记录表

A.1 双羔滩羊初生羔羊等级评定记录表见表 A.1。

表 A.1 双羔滩羊初生羔羊等级评定记录表

序号	羔羊号	性别	毛色特征	出生日期	初生重/kg	肩部毛股自然长度/cm	毛股弯曲数/个		花案	等级	备注
							肩部	股部			
评定人：											

A.2 双羔滩羊二毛羔羊等级评定记录表见表 A.2。

表 A.2 双羔滩羊二毛羔羊等级评定记录表

序号	耳号	性别	毛色特征	初生等级	评定日期	花穗类型	优良花穗分布面积/cm ²	毛股弯曲数(肩部)	毛股长/cm	弯曲/毛股	体重/kg	光泽	毡毛	毛股紧实度	体格发育	外貌缺陷	等级	备注	
评定人：																			

A.3 双羔滩羊育成羊等级评定记录表见表 A.3。

表 A.3 双羔滩羊育成羊等级评定记录表

序号	耳号	性别	体重/kg	毛色特征	年龄	二毛穗型	二毛等级	体格	体质	毛股长度/cm	羊毛密度	死毛	腹毛	尾型	尾长/cm	外貌缺陷	等级	备注	
评定人：																			