

T/GZSX

团 体 标 准

T/GZSX XXX—2019

刺 梨 苗 木

(征求意见稿)

2019-XX-XX 发布

2019-XX-XX 实施

贵州省食品工业协会 发 布

前 言

本标准依据 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而制定。

本标准由贵州宏财投资集团有限责任公司提出。

本标准由贵州省食品工业协会归口。

本标准起草单位：贵州宏财投资集团有限责任公司、贵州宏财聚农投资有限责任公司、贵州宏财刺梨检验检测有限责任公司、中国刺梨产业研究院、六盘水盈润科技服务有限公司。

本标准主要起草人：鲁鹏、李波、朱波、尚杰、李贵荣、邹雷、缪钢、龚孟、李娅英。

刺 梨 苗 木

1 范围

本标准规定了刺梨苗木的质量要求、检验方法、检验规则以及保管、包装和运输要求。
本标准适用于 1 年生—2 年生的刺梨实生苗、自根营养系苗和嫁接苗。。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 20464 农作物种子标签通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

实生苗
用种子繁育的的苗木。

3.2

扦插苗
用扦插方法繁育的苗木。

3.3

侧根数量
实生苗主根或扦插苗地下茎段直接长出的侧根数。

3.4

苗干高度
实生苗和扦插苗根茎部以上木质化苗干部分的长度。

4 质量要求

苗木质量应符合表 1 的最低要求, 不允许使用三年生及以上的苗木。

表 1

苗木类型	苗龄	I 级苗				II 级苗				检验方法
		地径（cm）	分枝（个）	≥5cm I 级侧根数	苗高（cm）	地径（cm）	分枝（个）	≥5cm I 级侧根数	苗高（cm）	
实生苗	1-0	≥0.25	2	5	35-45	0.20-0.25	1~2	4~5	35-45	目测法、用游标卡尺测量
扦插苗	1 ₁ -0	≥0.55	3	6	35-45	0.40-0.55	2~3	4~6	35-45	目测法、用游标卡尺测量

5 检验规则

5.1 抽样方法

采用随机抽样法。999 株以下抽样 10%；千株以上，在 999 株以下抽样 10%的基础上，对其余株数再抽样 2%。

- a) 999 株以下抽样数=具体株数 $\times$ 10%;
- b) 千株以上抽样数= 999 株以下抽样数+ [(具体株数— 999 株) $\times$ 2%]。
- 计算到小数点后两位数，四舍五入取整数。

5.2 质量判定规则

质量判定规则应执行 GB 20464 的规定。

6 保管、包装和运输

6.1 保管

冬天落叶后起苗，起苗后应对苗木进行修剪，剪去过长或受伤的根。应做好苗木越冬保管工作，通常保管在保持一定湿度的假植沟中。假植沟应选在背风、向阳、高燥处，沟宽 50 cm~100 cm, 沟深和沟长分别视苗高、气象条件和苗量确定。挖两条以上假植沟时，沟间距离应在 150 cm 以上。沟底铺湿沙或湿润细土 10 cm 厚，苗梢朝南，按砧木类型、品种和苗级清点数量，做好明显的标志，斜埋于假植沟内，填入湿沙或湿润细土，使苗的根、茎与沙土密接。苗木无越冬冻害或无春季“抽条”现象的地区，苗梢露出土堆外 10 cm 左右；苗木有越冬冻害或有春季“抽条”现象的地区，苗梢应埋入土堆以下 10 cm。冬季多雨雪的地区，应在假植沟四周挖排水沟。

6.2 包装

苗木运输前，应用稻草、草帘、蒲包、麻袋和草绳等包裹捆牢。每包 50 株，或根据用苗单位要求的数量包装，包内苗干和根部应填充保湿材料，以达到不霉、不烂、不干、不冻、不受损伤。长途运输时，包装前应在根部蘸上泥浆。包内外应附有苗木标签，标签应符合 GB 20464 的规定。雌株株数：雄株株数应为 6：1~8：1, 雄株苗单独包装。

6.3 运输

苗木运输应注意适时，运输途中应有帆布篷覆盖，做好防雨、防冻、防干、防火等工作。到达目的地后，应及时接收，并尽快定植或假植。