

团 体 标 准

T/CDNX 036—2020

勇福富硒香米栽培技术规程

Regulations for the cultivation technology of Yong Fu selenium-enriched scented rice

（征求意见稿）

2020-00-00 发布

2020-00-00 实施

常 德 市 农 学 会 发 布

目 次

前言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 产地环境..... 2

5 栽培技术..... 2

6 富硒技术..... 2

7 适时采收..... 2

8 档案管理..... 3

附录 A（资料性附录）田间管理档案4

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由常德市勇福农业发展有限公司提出。

本标准由常德市农学会归口。

本标准起草单位：常德市勇福农业发展有限公司、湖南春露农业开发有限公司、常德市农学会、常德职业技术学院、常德市农业农村局、常德市农林科学研究院、常德市老科学技术工作者协会、常德市老科协农业分会。

本标准主要起草人：熊桂华、邓正春、赵正林、王朝晖、吴仁明、张忠武、张平喜、郑文凯、杨才兵、汤勇、李飞翔、夏梨芳、陈志兵、王中美、杜云、伍志明、刘丽平、刘建军、邓家惠、秦佳婷。

勇福富硒香米栽培技术规程

1 范围

本标准规定了勇福富硒香米指定的（香型、粳型、优质，下同）水稻品种栽培的术语和定义、产地环境、栽培技术、富硒技术、适时采收、档案管理等技术内容。

本标准适用于勇福富硒香米指定的水稻品种栽培。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

NY/T 391 绿色食品 产地环境质量

NY/T 393 绿色食品 农药使用准则

NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则

GH/T 1135 富硒农产品

DB43/T 1469 优质稻兆优 5431 栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

勇福富硒香米 Yong Fu selenium-enriched scented rice

在勇福富硒香米指定的水稻品种生长发育过程中，通过自然富硒或以自然富集硒为主、硒生物营养强化技术富硒为辅，而非收获后或加工中添加硒，硒含量为 0.15mg/kg~0.50mg/kg，其中硒代氨基酸含量（硒代蛋氨酸、硒代胱氨酸和硒甲基硒代半胱氨酸含量之和）占总硒含量>65%的稻米。

[GH/T 1135-2017，富硒农产品 3.1]

3.2

硒生物营养强化技术 selenium rich technology

通过施用经国家登记的硒肥料或硒土壤调理剂，经生物转化而增加农产品有机态硒含量的技术。

[GH/T 1135-2017, 硒生物营养强化技术 3.1]

4 产地环境

基地宜选择土壤富含硒的地区。产地环境应符合 NY/T 391 的规定。

5 栽培技术

5.1 品种选择

选择品质优、产量高、抗性强的香型、粳型、优质水稻品种，种子质量应符合 GB 4404.1 的规定。

5.2 田间培管

壮秧培育、整地施肥、适时移栽、合理密植、肥水管理、病虫草害防治等技术应按 DB43/T 1469 的规定执行或可参照当地田间培管技术实施。

5.3 肥料施用

肥料施用应符合 NY/T 394 的规定。

5.4 化学防治

病虫草害化学防治应符合 NY/T 393 的规定。

6 富硒技术

6.1 补硒原则

自然富硒生产的稻谷硒含量达不到 GH/T 1135 规定时，可通过人工技术补硒。

6.2 补硒肥料

应选择经国家登记的硒肥料或硒土壤调理剂。

6.3 补硒方式

分叶面补硒和根际补硒。可根据生产实际任选一种或二者兼用的补硒方式。

6.3.1 叶面补硒

将硒肥料配成浓度 70mg/kg~120mg/kg 的硒溶液，在抽穗始期、灌浆初期分别补硒 1 次。每次每公顷人工或无人机均匀喷施硒溶液 450kg~750kg。要求叶面、穗面、籽粒表面均要喷施到硒溶液，以不滴水为度。应选阴天或晴天下午 4 时后施硒；硒溶液浓度精准，距叶片 35cm 细雾均匀喷施；施硒后 6h 之内遇雨水冲洗，应及时补喷 1 次；不应与碱性农药、肥料混用；采收前 20d 停止施硒。

6.3.2 根际补硒

土壤翻耕前，田间按产品说明施用硒土壤调理剂。然后翻耕，使土壤与硒肥充分混匀。

7 适时收割

在谷粒充分饱满、并 95%的谷粒变黄、枝梗 80%以上枯黄、稻谷含水量 20%左右时进行收割。收后及时烘干或晒干，清除杂草杂质，放入仓库中贮藏，保持阴凉通风。稻谷硒含量应符合 GB 28050 的要求。

8 档案管理

8.1 生产操作档案

对主要农事活动应逐项如实记载。记载内容参见附录 A. 1。

8.2 投入品使用档案

对主要投入品的品名、种类、来源，使用日期、用量、方法、效果等应逐项如实登记。记载内容参见附录 A. 2。

附 录 A
(资料性目录)
生产操作档案

表 A.1 农事活动记载表

丘块名称		面积(hm ²)		品 种	
序号	土壤种类、肥力、前茬作物	操作日期 (月、日)	操作内容 与方法	完成情况 及效果	记载人
1					
2					
...					

表 A.2 投入品使用记载表

丘块名称		面积(hm ²)			品种			
序号	品名	种类	来源	使用日期 (月、日)	用量	方法	效果	记载人
1								
2								
...								