

ICS 65.020.20

B 05

T/JJXSY

团 体 标 准

T/JJXSY 002—2023

靖江香沙芋种芋脱毒快繁技术规程

Technical regulation for rapid propagation of Jingjiang Xiangsha
virus-free seed taro

(发布稿)

2024-01-08 发布

2024-01-08 实施

靖江市香沙芋产销协会 发布

前 言

本标准按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求编写。

本文件起草单位：靖江市农业农村局、江苏省农业科学院、靖江市徐家蔬菜种植专业合作社、江苏红芽科技有限公司。

本文件主要起草人：羊雪萍、孙剑霞、王立、顾文军、高鹏、徐建勋、陆海兵。

靖江香沙芋种芋脱毒快繁技术规程

1 范围

本标准对靖江香沙芋脱毒组培苗培育、脱毒种芋繁殖体系的大田管理和种芋采收、预处理、贮存等采后环节的质量控制技术进行了规定。

本标准适用于靖江香沙芋的脱毒种芋繁殖工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本部分。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本部分。

GB/T 18407.1 无公害蔬菜产地环境要求

GB/T 8321 农药合理使用准则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 脱毒原原种芋

用组织培养方法对芋头进行脱毒，获得无病毒组培苗后，在防虫条件下种植获得的种芋。

3.2 脱毒原种芋

由脱毒原原种芋在防虫条件下种植获得的种芋。

3.3 脱毒种芋

由脱毒原种芋在符合条件产地种植获得的种芋。

4 生产基础条件要求

4.1 环境要求

符合 GB/T 18407.1 中所规定。

4.2 生产主体要求

符合《中华人民共和国种子法》和《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的经营主体。

4.3 脱毒组培苗扩繁基地要求

组培室组成包括准备室、接种室、培养室。培养室规模应与脱毒核心种芋繁殖圃面积相匹配,按照每万株脱毒组培苗 20 m² 建设。脱毒种芋按照“三级扩繁”体系建设,脱毒原原种芋繁殖圃、脱毒原种芋繁殖田、脱毒种芋繁殖田面积比为 1: 12: 140。

4.4 脱毒原原种芋繁殖基地要求

4.4.1 繁殖基地经营主体要求

需在专业化种芋生产单位进行,应具有防虫网棚内种植条件,由专业技术人员负责田间管理和去杂除劣操作等。

4.4.2 防虫网棚建设

防虫网选用 40 目~60 目优质尼龙纱网,棚内空间大(棚高 2 m 以上,宽 6 m~8 m),结构稳定,利于田间作业,具有较强的抗风性。

4.4.3 繁殖田块要求

靠近水源,排灌方便;选择土层深厚、土壤肥沃的偏沙性壤土;未种植芋头及甘薯、马铃薯、山药等地下根茎类作物 1 年以上;田间灌排沟系配套,水利设施齐全,达到“旱能灌,涝能排”。

4.5 脱毒原种芋繁殖基地要求

4.5.1 繁殖基地经营主体要求

同本标准 4.4.1。

4.5.2 防虫网棚建设

同本标准 4.4.2。

4.5.3 繁殖田块要求

同本标准 4.4.3。

4.6 脱毒种芋繁殖基地要求

4.6.1 繁殖基地经营主体要求

同本标准 4.2。

4.6.2 繁殖田块要求

同本标准 4.4.3。

5 靖江香沙芋脱毒组培苗培育

5.1 外植体培养和处理

以靖江香沙芋种芋萌发的顶芽为外植体。选取保存完好、无病斑的芋头，经质量比 0.2% 的高锰酸钾（ KMnO_4 ）灭菌处理 5 min，用灭菌后的细沙覆盖整个芋头的 2/3 处，放置于光照培养箱中促其萌发。当芽生长到 1 cm~2 cm 时切取茎尖，剥除茎尖外层 2 层~3 层叶片，流水冲洗 10 min，在超净工作台上用 75% 酒精浸泡 30 s，用 3% 次氯酸钠（ NaClO ）溶液消毒 10 min~15 min，无菌水漂洗 5 次~7 次。剥离茎尖外层叶鞘，在解剖镜下剥取 0.4 mm~0.8 mm 大小茎尖作为外植体。

5.2 组培苗芽

将剥取的外植体接种在 MS + 2,4-二氯苯氧乙酸（2, 4-D） 2.0 mg/L 的培养基中，在温度 25 ± 2 °C、光照强度 2200 Lux 左右的培养室内无菌培养 50 d~60 d，诱导形成分化出芽。

5.3 脱毒处理

组培芽苗在温度 $40\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、光照强度 2200 Lux 左右的培养室内无菌培养条件下再经 3 d 左右培养。

5.4 病毒鉴定

将组培苗芽切下，接种在 MS + 噻苯隆（TDZ）1.0 mg/L 的培养基中，长到两叶以上时（20 d 左右），取部分叶片利用酶联免疫分析（ELISA）法进行芋头花叶病毒（DMV）的检测。保留无病毒组培苗进行继代培养。

5.5 继代培养

将无病毒组培苗继续培养。当植株萌发出的不定芽达 2.0 cm 时，切下不定芽接种在 MS + TDZ 1.0 mg/L 的培养基中进行继代培养。一般连续继代培养不超过 2 次。

5.6 诱导生根

将高 $\geq 2.0\text{ cm}$ 、带有 2 片叶的健壮小苗分开，转入含 0.2%活性炭的 MS + 萘乙酸（NAA）0.5 mg/L + 6-苄氨基嘌呤（6-BA）0.1 mg/L 培养基中进行培养，诱导生根，形成脱毒试管苗。试管苗培养 30 d~40 d（根长 3 cm~5 cm）后，移栽田间扩繁脱毒原原种芋。

6 脱毒原原种芋繁殖

6.1 炼苗处理

最佳栽植时间为 4 月下旬~5 月上旬。移栽前一周将脱毒试管苗置于常温环境中炼苗，避免阳光直射。移栽前 1 d~2 d 打开瓶盖炼苗。

6.2 移栽种植

纵向筑畦作为苗床，畦高 6 cm~7 cm，畦面宽 1.0 m，畦沟宽 0.4 m，每畦种 2 行。按行距 50 cm 在苗床上开宽 15 cm、深 10 cm 的移栽行沟，沟内填实酸碱度中性（pH 6.8~7.3，EC 1 mS/cm~2 mS/cm）的常规蔬菜育苗基质，并浇透水。将炼苗后的试管苗洗净基部培养基，按株距 30 cm 栽入移栽行沟。栽后喷水保湿，搭小拱棚并加盖遮阳网。移栽后的前两周每天早晚各浇水 1 次，第二周开

始早上 10 时前和下午 4 时后打开遮阳网，第三周开始揭掉遮阳网。苗期保持棚内温度 15℃~25℃，若温度过高时上午 10 时~下午 4 时盖遮阳网降温。注意勤浇水，保持基质含水量 80%~90%。

6.3 病虫害控制

6.3.1 控制病害

每隔 15 d 左右选择晴天使用符合 GB/T 8321 规定的广谱保护性杀菌剂喷雾。

6.3.2 防治害虫

主要害虫为蚜虫、斜纹夜蛾和蛴螬，使用符合 GB/T 8321 规定的适宜杀虫剂进行化学喷雾防治。具体防治农药为：

表 1 靖江香沙芋主要害虫适宜使用方法对照表

害虫	适宜使用农药	防治方法
蛴螬	不使用农药	选择晴天下午 3 点左右开始灌水，保持浅水层至次日早晨，然后晾田 2 d~3 d。
蚜虫	吡虫啉及复配剂	采用 25%吡虫啉及复配剂 1000 倍液均匀喷雾。
斜纹夜蛾	氯虫苯甲酰胺+菊酯类杀虫剂	采用 10%氯虫苯甲酰胺+菊酯类杀虫剂 2000 液均匀喷雾，喷药时间应在傍晚或清晨。

6.4 苗床管理

6.4.1 控制温度

生长前期温度控制在 25℃ 以下，后期温度控制在 25℃~30℃。当温度≥30℃ 时，应覆盖遮阳网或喷水降温。

6.4.2 水分管理

晴天早晚可浇水各 1 次，阴天根据土壤温度、水分情况 3 d~4 d 浇水 1 次，保证基质不过干或过湿，以植株不出现缺水症状为宜。

6.4.3 肥料管理

全生育期只施肥 1 次。于 7 月下旬按照净苗床施硫酸钾复合肥（N15-P15-K15）30 kg/667 m²，或施用符合 NY/T 496 规定的氮磷钾等量的其他肥料（忌用含氯肥料）。

6.4.4 保留分株

全生育期不除边荷、不去分株。

6.5 收获保存

6.5.1 适时收获

11月上中旬收获为宜。收获前20 d不浇水，保持土壤干爽。

6.5.2 种芋处理

收获芋盘，不掰下子孙芋，保持芋盘完整；清理芋盘上泥土，晾晒1 d~2 d；用25%阿米西达悬浮液800倍液均匀喷雾，再晾晒1 d~2 d；用干生石灰粉均匀包裹，入库保存。

6.5.3 越冬储存

将处理后的种芋盘摆放在仓库内，先铺一层稻草，然后摆一层种芋盘，再均匀撒一层生石灰干粉。如此摆放多层，堆高不宜超过1 m。库内温度控制在5℃~8℃，相对湿度80%~90%，定期通风，保持仓库内清洁卫生。贮藏期间及时剔除烂芋。

7 脱毒原种芋繁殖

7.1 整地作畦

冬前深耕晒垡，施入腐熟的农家肥2000 kg/667 m²左右，春季再次施腐熟的农家肥1000 kg/667 m²左右。播种前做好畦，畦高6 cm~7 cm，畦面宽1.0 m左右，畦沟宽0.2 m左右。覆土后全田均匀喷洒96%金都尔乳油800倍液。整畦覆盖黑色地膜，应平整紧密，及时培土密封膜边，防止地膜破损。

7.2 播种要求

7.2.1 3月中下旬播种。

7.2.2 每畦2行，行距40 cm，株距30 cm，或种植密度约3500株/667 m²。

7.2.3 黑膜上开播种穴，每穴摆放1个种芋后覆土，要求芋顶芽上盖土厚度≥5

cm。

7.3 播后管理

7.3.1 播种出苗期间土壤含水量在 70%~80%为宜。若遇长期干旱,要及时浇水。

7.3.2 苗期保持田间土壤含水量不低于 60%。

7.3.3 病虫害控制

病害防治方法同 6.3.1 款。

虫害防治方法同 6.3.2 款。

7.3.4 生长期管理

a) 水分管理 保持土壤含水量 70%左右,干旱时及时浇水。7 月份在无有效降雨情况下,每隔 5 d~7 d 灌水 1 次,要“沟灌窖水,夜灌晨排”,不大水漫灌,不能长期淹水。8 月上旬以后,灌水次数可减少,土壤偏干应及时灌水,灌水方法同 7 月份。

b) 施肥要求 当叶龄达到 8 叶~9 叶时(一般在 7 月上旬~中旬),及时追肥。撒施菜籽饼 150 kg/667 m² 左右+硫酸钾复合肥(N15-P15-K15) 40 kg/667 m² 左右,或施用符合 NY/T 496《肥料合理使用准则 通则》规定的相等氮磷钾施用量的其他肥料。

c) 壅根培土 7 月中下旬进行壅根培土。挖取畦间沟内泥土,培于芋头行上,壅土高度≥15 cm。

d) 全生育期不要去除分株。

7.4 收获保存

同本标准 6.5 款。

8 脱毒种芋扩繁

利用脱毒原种芋在大田进行扩繁,生产管理、保存方法同本标准第 7 款。
